



FORMACIÓN DE PRIMEROS AUXILIOS

11 de febrero de 2018

ATAQUES EPILEPTICOS

Serie de convulsiones o movimientos corporales incontrolados de forma repetitiva, sin causa aparente

| TIPO | DESCRIPCION | TRATAMIENTO |
|------------------|---|---|
| GRAN MAL | Convulsiones generalizadas con pérdida de conciencia y movimientos bruscos de todo el cuerpo. | Carbamazepina, Fenitoína, Valproato de Sodio. |
| PEQUEÑO MAL | Convulsiones generalizadas con pérdida de conciencia y movimientos bruscos de todo el cuerpo. | Carbamazepina, Fenitoína, Valproato de Sodio. |
| CRISIS PARciales | Convulsiones que afectan a una parte del cuerpo, como una mano o una pierna. | Carbamazepina, Fenitoína, Valproato de Sodio. |

AURA
EPILEPTICA



ATAQUES EPILEPTICOS

Serie de convulsiones o movimientos corporales incoordinados de forma repetitiva. Sin causas aparentes.

| TIPO | CAUSAS |
|-----------|--------|
| GRAND MAL | ... |
| SMALL MAL | ... |
| ... | ... |

BUSCA INTELIGENTE







RESUSCITACIÓN EN NIÑOS

Resuscitación Clase IIb)

niños mayores de 8 años (Kg) utilizar el mismo equipo que en adultos.


niños entre 1 y 8 años utilizar el equipo de RESUS, si es posible con el adaptador infantil.







... años
... el mismo
... llos.
... utilizar




A woman in a pink sweater and patterned scarf is leaning forward, resting her hands on a wooden bench. She is looking down at a blue bag on the bench.

A woman in a light blue sweater is sitting on a wooden bench, looking towards the center of the room.

A woman in a dark blue sweater is leaning over a person lying on a blue mat on the floor. She appears to be providing assistance or a massage.



... mismo
... que en adultos.
... utilizar



DESA EN NIÑOS

(Recomendación Clase IIb)

- En niños mayores de 8 años (peso > 25 Kg) utilizar el mismo protocolo que en adultos.
- En niños entre 1 y 8 años utilizar el DESA, si es posible con adaptador infantil.



